

Kinderval 5%

Permetrina 5%

Crema Fluida

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

Composición:

Cada 100 ml de crema fluida contiene: Permetrina 5,00 g.

Excipientes: Cloruro de Estearildimetilbencilamonio; Alcohol Cetílico; Oxiestearato de glicerina-polietilenglicol; Hidroxietilcelulosa; Acido Cítrico; Propilenglicol; Alcohol Isopropílico; Metilparabeno; Propilparabeno; Imidazolidinilurea; Hidróxido de sodio c.s. pH 5±1; Agua purificada c.s.

Acción terapéutica:

Es un piretroide de amplio espectro siendo activo contra piojos, sarcoptes, garrapatas, pulgas y otros artrópodos.

Indicaciones:

Ectoparasiticida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis y la escabiosis del cuero cabelludo.

Acción farmacológica:

Actúa sobre la membrana celular rompiendo la corriente del canal de sodio por el cual la polarización de la membrana se regula. La parálisis y muerte de los artrópodos son la consecuencia de estos trastornos.

Modo de empleo:

Pediculosis

- 1 - Luego de lavar el cabello con el champú habitual, enjuagar y secar con toalla.
- 2 - Colocar KINDERVAL 5%, impregnando el cabello y el cuero cabelludo en toda su superficie.
- 3 - Dejar actuar durante 10 minutos.
- 4 - Enjuagar con abundante agua hasta eliminar toda la crema fluida.
- 5 - Peinar con peine fino para remover de este modo piojos y liendres.
- 6 - Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo, si se observan piojos o liendres puede repetirse el tratamiento a la semana o a los 14 días.

Escabiosis

- 1 - Luego de bañarse y secarse bien, aplicar KINDERVAL 5% con un suave masaje sobre la piel desde el cuello hasta los pies incluyendo palmas y plantas. Dejar actuar de 8 a 14 horas y luego remover mediante lavado (baño) con abundante agua y jabón.
- 2 - Realizar el tratamiento los días 1, 5 y 10.

Contraindicaciones:

No emplear en: menores de 2 (dos) años de edad, mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando, ni en pacientes hipersensibles (alérgicos) a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Precauciones y advertencias:

- 1 - Este medicamento es de uso externo exclusivo. Si se presenta irritación y/o infección cutánea o del cuero cabelludo, consultar al médico.
- 2 - No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- 3 - Para evitar la irritación de la piel: no colocar el producto más veces de lo indicado aunque la piel siga causando picazón.
- 4 - No usar otros productos en forma simultánea sin indicación médica.
- 5 - **No utilizar como preventivo. Para tratamientos repetidos consultar al médico.**
- 6 - Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy cerrados (poco aireados).

Reacciones adversas:

Prurito, enrojecimiento o edema de la piel o cuero cabelludo.
Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

Información para el paciente:

- 1 - Los piojos viven en el cuero cabelludo y dejan sus huecos (liendres) adheridos al pelo, cerca de la raíz del mismo. Las liendres suelen ser visibles cerca del cuello (nuca) y detrás de las orejas, pero pueden encontrarse en cualquier lugar de la cabeza.
- 2 - Los peines y cepillos deben ser desinfectados en agua hirviendo durante por lo menos 5 (cinco) minutos debido a que ninguna piretrina es totalmente ovidada (no actúa sobre todas las liendres, sino solo sobre las más expuestas) y a pesar de la actividad residual de las mismas, es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino y en ocasiones repetir el tratamiento a los 7 (siete) o 14 (catorce) días de la primera aplicación.
- 3 - No debe emplearse este producto como cosmético ni en forma preventiva ya que la acción del medicamento se produce sobre piojos y liendres más expuestas.
- 4 - Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser lavadas con agua caliente o en lavarropas durante 20 minutos. Aquellas prendas que no puedan ser lavadas deben dejarse en bolsa de plástico cerrada durante 2 (dos) semanas.
- 5 - El grupo de convivencia del paciente debe ser evaluado ya que es más efectivo el tratamiento cuando se realiza simultáneamente en todas las personas afectadas o infestadas por la parasitosis.
- 6 - En escabiosis, es importante acompañar el tratamiento con medidas higiénicas de ropa de vestir y de cama. El tratamiento debe realizarse simultáneamente en todos los convivientes.
- 7 - En adultos, cortar y cepillar las uñas de manos y pies. En niños mayores de 2 años cubrir manos y pies para evitar la ingesta del mismo.
- 8 - Este medicamento es de uso externo exclusivo. Si se presenta irritación y/o infección cutánea o del cuero cabelludo, consultar al médico.
- 9 - No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce contacto con los ojos lavar con abundante agua.
- 10 - Para evitar la irritación de la piel: no colocar el producto más veces de lo indicado aunque la piel siga causando picazón.
- 11 - No usar otros productos en forma simultánea sin indicación médica.
- 12 - **No utilizar como preventivo. Para tratamientos repetidos consultar al médico.**
- 13 - Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy cerrados (poco aireados).

Presentación:

Envases por 60 y 100 ml.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente.

Mantener este, como todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.

Este medicamento es de uso externo exclusivo.

Ante la ingestión accidental, se recomienda consultar con un centro toxicológico:

HOSPITAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ: TEL. (011) 4962-6666 / 2247

HOSPITAL PROF. A. POSADAS: TEL. (011) 4658-7777 / 6648

HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE: TEL. (011) 4300-2115

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 39.031

021EM01933-PROS-01

**LABORATORIO OMICRON S.A.**

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. Gral. San Martín,

Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: 4752-5081 / 4754-1043.

Director Técnico: Leonardo Scopel - Farmacéutico