

# Kinderval Max

## Loción Tópica

Permetrina 1%

Benzoato de bencilo 10%

Aminobenzoato de etilo 3%

Industria Argentina

Venta Libre

### Fórmula:

*Cada 100 ml de loción contiene:*

Permetrina 1,00 g; Benzoato de Bencilo 10,00 g; Aminobenzoato de Etilo 3,00 g.

Excipientes: Propilenglicol, Alcohol Isopropílico, Esencia de Lavanda, Alcohol c.s.p. 100 ml.

### Indicaciones:

Ectoparasiticida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

### Modo de uso:

Aplicar únicamente sobre cabello seco.

Aplicar masajeando una cantidad suficiente de loción hasta asegurarse de haber empapado el cabello completamente hasta las raíces y el cuero cabelludo.

Dejar actuar durante 10 minutos.

Pasado ese periodo de tiempo enjuagar con abundante agua hasta eliminar todo resto de la loción.

Peinar con peine fino para remover de este modo los piojos y las liendres más expuestos.

Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo, si se observan piojos o liendres puede volver a repetirse el tratamiento a la semana o a los 14 días.

### Reacciones adversas:

Prurito, enrojecimiento o edema del cuero cabelludo. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

### Precauciones y advertencias:

\* Este medicamento es de uso externo exclusivo. No ingerir.

\* Si se presenta irritación cutánea y/o infección del cuero cabelludo, consultar al médico.

\* No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

\* No utilizar como preventivo.

\* Para tratamientos repetidos, consultar al médico.

\* Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy cerrados (poco aireados).

\* Si usted está tomando algún medicamento consulte con su médico antes de utilizar esta loción tópica.

### Contraindicaciones:

No utilizar este medicamento en menores de 2 años de edad, ni en mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando, ni en pacientes hipersensibles (alérgicos) a cualquiera de los componentes de la fórmula.

### Información para el paciente:

Los piojos viven en el cuero cabelludo y dejan sus huevos (liendres) adheridos al pelo, cerca de la raíz del mismo. Las liendres suelen ser visibles cerca del cuello (nuca) y detrás de las orejas, pero pueden encontrarse en cualquier lugar de la cabeza.

Debido a que ninguna piretrina es totalmente ovidica (no actúa sobre todas las liendres sino sólo sobre las más expuestas) y a pesar de la actividad residual de las mismas, es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino, y en ocasiones repetir el tratamiento a los 7 (siete) días del primero.

Todas las prendas y la ropa de cama en contacto con el paciente, deben ser lavadas con agua caliente y jabón, o en lavarropas durante 20 minutos y después de secas plancharlas.

Aquellas prendas que no puedan ser lavadas deben dejarse en bolsas de plástico cerradas, durante 2 (dos) semanas.

Los peines y cepillos deben ser desinfectados en agua hirviendo durante por lo menos 5 (cinco) minutos.

No debe emplearse este producto como cosmético ni en forma preventiva ya que la acción del medicamento se produce sobre piojos y liendres más expuestas.

El grupo de convivencia del paciente debe ser evaluado, ya que es más efectivo el tratamiento cuando se realiza simultáneamente en todas las personas afectadas o infestadas por la pediculosis.

**Conservación:**

A temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C, en su envase cerrado y al abrigo de la luz.

**Presentación:**

Frascos por 60 ml y 100 ml.

***Uso externo exclusivo.***

***Mantener fuera del alcance de los niños.***

***No utilizar como preventivo.***

***Uso semanal: debe esperarse como mínimo una semana entre dos aplicaciones.***

***Para tratamientos repetidos consultar al médico y/o farmacéutico.***

Ante la ingestión accidental, se recomienda consultar con un Centro de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Prof. A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 7.771

021EM01893-PROS-02



**LABORATORIO OMICRON S.A.**

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. de San Martín,

Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: 4752-5081 / 4754-1043.

**Director Técnico:** Leonardo Scopel - Farmacéutico.