

Volforte Spray 1,16 %

Diclofenac dietilamina 1,16 %

Spray tópico

Industria Argentina

Venta Libre

Composición:

Cada 100 g de spray contiene: Diclofenac Dietilamina 1,16 g.

Excipientes: Metilparabeno; Edetato Disódico; Isopropanol; Propilenglicol; Trietanolamina; Agua Purificada c.s.

Acción terapéutica:

Antiinflamatorio y analgésico tópico.

Descripción de la seguridad del envase:

Si el envase se encuentra abierto o adulterado, si el estuche tiene tachaduras o enmiendas no utilice el producto.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

Indicaciones:

Para el alivio sintomático de inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos provocados por torceduras o traumatismos.

Modo de uso:

Lavar y secar cuidadosamente la zona dolorida. Realizar entre 3 y 4 aplicaciones dependiendo de la amplitud de la zona a tratar, tres veces al día. Masajear suavemente para facilitar la absorción. Luego de su aplicación las manos deberán lavarse, a no ser que estas sean el motivo del tratamiento. Uso externo exclusivamente.

Contraindicaciones:

Pacientes con hipersensibilidad al diclofenac. Personas con asma, rinitis o urticaria, alérgicos a la aspirina, deberán consultar con su médico o farmacéutico antes de consumir este producto.

Advertencias y precauciones:

No aplicar sobre heridas abiertas, úlceras o quemaduras. El medicamento no debe tomar contacto con ojos o mucosas. Excepcionalmente pueden presentarse ardor prurito y erupción cutánea, que desaparecen al suspender la medicación.

La administración de diclofenac en forma de spray debe reservarse para adultos y jóvenes mayores de 15 años.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Los pacientes de edad avanzada deberán consultar con su médico o farmacéutico antes de utilizar este producto.

Se pueden presentar reacciones cutáneas locales por hipersensibilidad o de tipo irritativo (ej.: ardor, prurito, erupción cutánea y/o eritema localizado).

Reacciones sistémicas por hipersensibilidad:

Dermatológicas: rash cutáneo.

Respiratorias: el desencadenamiento de una crisis de asma en ciertos pacientes puede estar ligado a alergia a la aspirina u otros AINEs.

Si los síntomas, malestares o dolencias persisten por más de 5 días, consulte a su médico.

Sobredosis:

Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.:(011) 4962-6666 / 2247
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde Tel.:(011) 4300-2115 / 4362-6063
Hospital Nacional Profesor A. Posadas Tel.:(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Sor María Ludovica Tel.:(0221) 451-5555

USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE

Presentación:

Frasco plástico con bomba atomizadora de 30, 50, 70 y 90 g.

Conservación:

Conservar a una temperatura de entre 15°C y 30°C al abrigo de la luz.
No exponer al calor excesivo.

***Mantenga este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.***

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud
Certificado N° 52.367

021EM02027-PROS-01



LABORATORIO
OMICRON

LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. Gral. San Martín,

Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: 4752-5081 / 4754-1043.

Director Técnico: Leonardo Scopel - Farmacéutico