



Aludrox II

Suspensión - Comprimidos masticables

Hidróxido de aluminio
Hidróxido de magnesio
Simeticona

Industria Argentina Venta libre

Fórmula cuali-cuantitativa:

Suspensión

Cada 5 ml de suspensión contiene: Hidróxido de Aluminio gel desecado 400,0 mg; Hidróxido de Magnesio 400,0 mg; Simeticona (Metilpolisiloxano activado) 30,0 mg.
Excipientes: Sorbitol 70%; Metilcelulosa; Propilparabeno; Metilparabeno; Sacarina Soluble; Aromatizante artificial de limón; Aromatizante artificial de menta; Agua Purificada c.s.p.

Comprimidos Masticables (*Sabor Clásico*)

Cada comprimido masticable contiene: Hidróxido de Aluminio gel desecado 400,0 mg; Hidróxido de Magnesio 400,0 mg; Simeticona (Metilpolisiloxano activado) 30,0 mg.
Excipientes: Celulosa Microcristalina; Ciclamato de Sodio; Manitol; Povidona; Estearato de Magnesio; Esencia de Vainilla; Sorbitol c.s.p.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

Acción terapéutica:

Antiacido. Antiflatulento.

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de la acidez gástrica. Flatulencia (gases intestinales).

Acción farmacológica:

ALUDROX II es una medicación antiácida que contiene **Hidróxido de Aluminio** e **Hidróxido de Magnesio**, principios activos que son insolubles, no se absorben y se combinan con el ácido clorhídrico del estómago produciendo su neutralización.

Contiene también **Simeticona**, que es un elemento inerte, derivado del silicio, que tampoco se absorbe, ejerciendo su efecto antigas en la luz estomacal e intestinal. La Simeticona, provoca la ruptura de las burbujas formadas por aire y mucus que se encuentran en el estómago e intestino, liberando de ese modo el gas que puede ser eliminado fácilmente, evitando así distensión y la consecuente sensación de malestar y discomfort.

Dosis y modo de uso:

Como dosis promedio de orientación se recomienda:

* Suspensión: 5 ó 10 ml ante la aparición de los síntomas de acidez, agitando el frasco antes de su uso.

* Comprimidos Masticables: 1 ó 2 comprimidos masticables, ante la aparición de los síntomas de acidez.

Dosis máxima: Se aconseja no superar la dosis de 8 comprimidos ó 40 ml de suspensión en 24 horas.

Contraindicaciones:

Insuficiencia renal severa.

Advertencias:

De no producirse mejoría del cuadro de hiperacidez al cabo de una semana, consultar al médico.

Precauciones:

Debe ser utilizado con precaución por personas con algún trastorno de la función renal, puede causar deficiencia de fósforo en consumidores que realicen una dieta pobre en este elemento.

Reacciones adversas:

Excepcionalmente puede producirse estreñimiento o diarrea.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosis accidental, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666

Hospital Prof. A. Posadas (011) 4658-7777

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.

Presentación:

Suspensión: Envases conteniendo 150 ml.

Comprimidos masticables: Envases conteniendo 6 y 18 comprimidos.

CONSERVAR AL ABRIGO DEL CALOR (NO MAYOR DE 30°C).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.521

Comprimidos masticables: Elaborado en Galicia 2652, CABA.

021EM01919-04



**LABORATORIO
OMICRON**

LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), San Martín, Pcia. de Buenos Aires

www.laboratorio-omicron.com.ar

Director Técnico: Mauro Soria, Farmacéutico