

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.  
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962-6666 / 2247  
Hospital Dr. Juan P. Garraham - Tel.: (011) 4941-6191 / 6012  
Hospital Dr. Juan A. Fernández - Tel.: (011) 4801-5555  
Hospital Nacional Prof. A. Posadas - Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

ANMAT Responde: 0800-333-1234

**MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**Forma de conservación:**

Conservar a temperatura ambiente no mayor de 30°C. Mantener el producto en su envase original, al abrigo de la luz y la humedad. Conservar en el envase original. No utilizar luego de la fecha de vencimiento.

**Presentaciones:**

Envases conteniendo 15 y 30 comprimidos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 52.545

Elaboración: Hipólito Yrigoyen N° 3769/71, CABA

021EM00110-03



**LABORATORIO OMICRON S.A.**

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), San Martín, Pcia. de Buenos Aires  
[www.laboratorio-omicron.com.ar](http://www.laboratorio-omicron.com.ar)

Director Técnico: Mauro Soria, Farmacéutico.

Fecha de última revisión del prospecto aprobado por ANMAT: DI-2021-1090.

**AMODORMIN VL**

**DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO 25 mg**  
**Comprimidos**

Industria Argentina

VENTA LIBRE

**Lea atentamente el prospecto  
contiene información importante  
para usted.**

**Conducción vehicular y uso de máquinas:**

Este medicamento causa somnolencia poco después de ingerirlo, no se debe conducir ni utilizar maquinaria durante las 8 horas siguientes de tomarlo.

**¿Qué contiene AMODORMIN VL?**

Cada comprimido contiene:

Ingrediente activo: Difenhidramina Clorhidrato 25,0 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina; Almidón Glicolato sódico; Anhídrido Silícico coloidal; Lactosa Granular; Estearato de Magnesio.

Este medicamento contiene difenhidramina clorhidrato, perteneciente al grupo de medicamentos denominados antihistamínicos.

**Acción:**

Efecto sedante y facilitador del sueño.

**¿Para qué se utiliza AMODORMIN VL?**

Indicado para ayudar a conciliar el sueño en caso de insomnio ocasional nocturno, para ser utilizado por períodos cortos de tiempo.

## **¿Qué personas NO pueden utilizar AMODORMIN VL?**

NO USE AMODORMIN VL si usted sabe que es alérgico a la Difenhidramina Clorhidrato o a cualquiera de los ingredientes de la fórmula.

Si está embarazada o en período de lactancia.

Si está recibiendo IMAO (inhibidores de la mono amino oxidasa) o antidepresivos tricíclicos.

Si es menor de 18 años.

## **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar AMODORMIN VL?**

Interrumpa el uso y consulte a su médico si presenta:

- Está consumiendo otros medicamentos con difenhidramina.
- Está consumiendo sedantes.
- Tiene asma.
- Tiene una úlcera en el estomago o una obstrucción de intestino y/o vejiga.
- Padece de glaucoma de ángulo cerrado (presión ocular).
- Padece problemas de agrandamiento de próstata o de retención de orina.
- Padece porfiria (una enfermedad de la sangre)

**Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si usted:**

- Tiene enfermedad de hígado y/o riñón.
- Bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Padece otro tipo de glaucoma.
- Padece dificultad para orinar.
- Miastenia gravis (enfermedad del músculo)
- Padece ataques epilépticos.
- Padece una condición denominada tinnitus (zumbido de los oídos)

## **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando AMODORMIN VL?**

Deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente a un médico si presenta:

- Hinchazón en la cara, labios, lengua y/o garganta.
- Dificultad para tragar y/o respirar.

- Sarpullido en la piel.

Los síntomas anteriormente mencionados pueden significar que usted está padeciendo una reacción alérgica grave a este medicamento.

Consulte a su médico si mientras toma este medicamento siente malestar, nota cualquier efecto inusual o experimenta alguno de estos síntomas:

- Dolor de cabeza.
- Movimientos musculares involuntarios o dificultad para coordinar.
- Malestar del estómago, vómitos.
- Presión arterial baja; latidos rápidos, más lentos o irregulares del corazón.
- Confusión, depresión.
- Enfermedad en el hígado.
- Trastornos del sueño, temblores, convulsiones, aumento de la transpiración.
- Dolor muscular y rigidez, dolor punzante, contracciones musculares, inestabilidad.
- Retención de orina y dificultad para orinar.
- Tinnitus.
- Urticaria.
- Disminución del sentido del tacto.
- Inquietud, excitación y reducción de la atención.
- Aumento de la energía.
- Moco bronquial más espeso.

Los siguientes son efectos secundarios no deseados leves y observados 8 horas luego de tomar este medicamento:

- Visión borrosa, mareos, somnolencia, sensación de nervismo.
- Boca seca.
- Náuseas (sensación de malestar del estómago)

## **¿Cómo se usa AMODORMIN VL?**

Adultos y mayores de 18 años: 1 ó 2 comprimidos al momento de dormir.

Si los síntomas persisten por más de 7 días o empeoran, consulte a su médico.