

# Flogodisten Duo Gel

**Mentol**

**Eucaliptol**

## Gel - Uso externo

Industria Argentina      Venta Libre

---

**Composición:**

Cada 100 g de gel contiene: Mentol 15,00 g; Eucaliptol 8,40 g.  
Excipientes: Lanolina; Vaselina Líquida; Vaselina Sólida.

**Acción terapéutica:**

Analgésico - Antiinflamatorio.

**Indicaciones:**

Terapéutica temporaria de los padecimientos dolorosos e inflamatorios a nivel muscular o articular asociados con artritis, bursitis, artralgias, golpes, torceduras, contusiones, dorsalgias simples, afecciones reumáticas, traumatismos deportivos. Coadyuvante en la terapia de las enfermedades reumáticas.

**Dosis:**

Extender una cantidad del producto sobre la zona afectada como para cubrirla. Friccionar suavemente para lograr la mejor penetración del gel, hasta que se haya absorbido totalmente. La aplicación puede ser repetida varias veces al día, de acuerdo con la intensidad del dolor o la inflamación a tratar.

**Modo de uso:**

Se aplica en forma tópica cutánea sobre las áreas afectadas, inflamadas o doloridas, friccionando suavemente, la cantidad necesaria para cubrir adecuadamente en su amplitud la zona o zonas afectadas.

Adultos y niños mayores de 12 años: luego de la limpieza de la piel, en especial si se colocaron previamente otros fármacos, bajo forma de cremas, ungüentos, linimentos, aerosoles u otras formas tópicas, se aplica Flogodisten DuoGel mediante una suave dispersión, repitiendo la dosis 3 a 4 veces al día. Puede ser empleado con vendajes húmedos o secos, si bien no necesita cobertura protectora alguna. Aplicar la cantidad necesaria para cubrir la superficie a tratar con una capa fina. Friccionar suavemente para lograr la mejor penetración del gel, hasta que se haya absorbido totalmente. La aplicación puede ser repetida tres a cuatro veces al día, de acuerdo con la intensidad del dolor o la inflamación a tratar. Es aconsejable realizar el tratamiento preferentemente por la noche al acostarse y por la mañana al levantarse. Para el caso de deportistas, aplicar antes y después de cada práctica deportiva. El tratamiento puede prolongarse el tiempo necesario para obtener un alivio efectivo.

**SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 7 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO.**

**Advertencias y precauciones:**

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No debe aplicarse sobre mucosas, lesiones expuestas o dermatosis. No debe aplicarse alrededor de los ojos. Luego de aplicado el medicamento, no debe aplicarse calor sobre la zona tratada, pues hay riesgo de que se produzca una irritación cutánea. Se desaconseja su uso en menores de 12 años sin indicación médica, ya que es un tóxico pediátrico común. En caso de pacientes con sensibilidad a alguno de los componentes de la formulación consultar al médico antes de iniciar el tratamiento. Si lo hubiera iniciado, suspender inmediatamente y consultar con el médico. Evitar la ingestión del producto. En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y consultar al médico. Una vez aplicado el producto lavarse las manos con agua y jabón.

**Efectos adversos:**

Ocasionalmente puede presentar alguna reacción de hipersensibilización al mentol.

**Presentación:**

Envases conteniendo 30, 50 y 100 g de gel.

**Conservación:**

Almacenar a temperatura ambiente.

**En caso de ingestión accidental, llamar a los Centros de Toxicología:**

Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:

Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde:

Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional Profesor A. Posadas:

Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O A SU FARMACÉUTICO.**

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud  
Certificado N° 53.427

021EM01888-02



**LABORATORIO OMICRON S.A.**

Calle 23 esq. 66, V. Zagala (B1651CPC) San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

[www.laboratorio-omicron.com.ar](http://www.laboratorio-omicron.com.ar)

Director Técnico: Mauro Soria, Farmacéutico.