



MODATON® N.I.

Jalea normalizadora intestinal
Vaselina Líquida

Industria Argentina Venta Libre

FORMULA:Cada 100 g contiene: Vaselina líquida 78,230 g. Excipientes: Azúcar refinada, Ácido cítrico, Esencia de frambuesa-ciruela, Gelatina 220 bloom, Colorante Rojo Punzó 4R, Nipagin, Sorbitol líquido 70%, Agua purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Evacuante lubricante intestinal. (A06AA).

USO DEL MEDICAMENTO. LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION: Modaton NI se utiliza para el tratamiento sintomático de la constipación ocasional, especialmente cuando las medidas higiénico-diétarias han fracasado. También está indicado para cuando sea necesario mantener las heces blandas como en el caso de postoperatorio de cirugía rectal.

POSOLOGÍA: Su dosis se adecuará según criterio médico; como orientación se sugiere la administración por vía oral, solo o untado sobre una galletita. Niños entre 6 y 12 años: 3 a 4 cucharadas de las de café, una vez al día, preferentemente por la noche. Niños mayores de 12 años y adultos: 1 a 4 cucharadas soperas una vez al día, preferentemente por la noche. Los resultados, en general, son satisfactorios al día siguiente de administrado.

Si la constipación persiste por más de 3 o 4 días o empeora consulte con su médico. No exceder las dosis aconsejadas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Modaton NI no deberá administrarse en sujetos ancianos muy debilitados o con trastornos de la deglución, por la posibilidad de broncoaspiración y riesgo de producir neumonía lipoidea. Tampoco en casos de Síndrome de oclusión intestinal, ni en los casos de Síndrome de dolor abdominal de origen desconocido. El uso crónico y en altas dosis de este medicamento puede alterar la absorción de las Vitaminas liposolubles (A y

en menor proporción D y K), de las hormonas esteroideas y de los anticonceptivos orales. Asimismo la menor absorción de vitamina K puede aumentar los efectos de los anticoagulantes orales. La absorción parcial de la vaselina puede producir una reacción inflamatoria en ganglios linfáticos. El uso de Modaton NI puede provocar deslizamiento de vaselina por el esfínter anal, provocando prurito.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de sobredosis concurrir a centro asistencial más cercano y/o comunicarse con un centro Toxicológico, por ej.: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247 - Hospital General de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115 - Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 310 g.

MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 35.537

021EM00025-PROS-03



LABORATORIO
OMICRON

LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), Pdo. de San Martín,
Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos: (011) 4752-5081 / (011) 4754-1043

Director Técnico: Mauro Soria - Farmacéutico.