

Novo Benitol

**Carbonato de Calcio
Ácido Aminoacético**

Antiácido - Comprimidos

Industria Argentina Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN NANTES DE USAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

Cada comprimido contiene: Ingredientes activos: Carbonato de calcio 350 miligramos, Ácido aminoacético 150 miligramos. Ingredientes inactivos: Almidón de maíz, Gelatina en polvo, Sacarina sódica, Aceite esencia de menta y Estearato de magnesio.

Acción

Antiácido.

¿Para qué se usa NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

Se usa para el alivio de los síntomas relacionados con la acidez estomacal. Alivio de ardor epigástrico.

¿Qué personas no pueden usar NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico al Carbonato de calcio, al Ácido aminoacético o a cualquier otro ingrediente de la fórmula, si padece aumento de calcio en la sangre, cálculos renales, alteración severa de la función renal o bajos niveles de fósforo en sangre.
NO USE este medicamento en niños menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

Consulte a su médico si usted tiene:

- Dificultad o dolor al tragar los alimentos.
- Vómitos reiterados o con sangre.
- Materia fecal de color negra o con sangre.
- Dolor en el pecho que se propaga a los brazos.
- Dificultad al respirar acompañada de acidez.
- Pérdida de peso sin causa que la explique. El carbonato de calcio disminuye la absorción de medicamentos Antibióticos, Digoxina y Hierro (por vía oral). No se recomienda el uso de este medicamento si está tomando también Antibióticos, Digoxina o Hierro.
- Los diuréticos Tiazídicos pueden provocar retención de calcio, si se administran conjuntamente con NOVO BENITOL ANTIACIDO pueden producir aumento de calcio en sangre.

Si usted padece alguna enfermedad, está tomando algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Cómo se usa NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

Adultos y niños mayores de 12 años: Deje disolver lentamente en la boca 2 comprimidos después de las comidas o cuando sienta acidez o ardor estomacal. Si los síntomas persisten o reaparecen repetir la ingesta cada dos horas.

Dosis diaria máxima: 12 comprimidos.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando NOVO BENITOL ANTIÁCIDO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como constipación, eructos o cálculos renales (si el uso es prolongado). Si los síntomas persisten por más de 14 días o empeoran, suspenda la medicación y consulte con su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé más cantidad de la necesaria?

En caso de sobredosis o de ingestión accidental concurre al Hospital más cercano o comuníquese con los siguientes Centros de Toxicología:

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital de Niños Dr. Pedro De Elizalde (011) 4300-2115
- Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (011) 4654-6648/4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT responde: 0800 333 1234

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Forma de conservación

Conservar en lugar fresco y seco.

Este medicamento no debe usarse después de la fecha de vencimiento que se indica en el envase.

Presentaciones

Envases conteniendo 20 comprimidos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 21.575

Elaboración: Hipólito Yrigoyen 3769/71, CABA.

021EM00142-02



LABORATORIO OMICRON S.A.

Calle 23 Esq. 66, V. Zagala (B1651CPC), San Martín, Pcia. de Buenos Aires

www.laboratorio-omicron.com.ar

Director Técnico: Mauro Soria, Farmacéutico.